

RUVAST® 10 mg

RUVAST® 20 mg

Rosuvastatine

Comprimé pelliculé

Composition :

Chaque comprimé pelliculé de RUVAST® 10 mg contient 10,395 mg de Rosuvastatine calcium équivalent à 10 mg de Rosuvastatine.

Chaque comprimé pelliculé de RUVAST® 20 mg contient 20,790 mg de Rosuvastatine calcium équivalent à 20 mg de Rosuvastatine.

Excipients : Lactose monohydraté, Cellulose microcristalline, Hydrogénophosphate de calcium anhydre, Croscopolone, Stéarate de magnésium, Opadry II rose 85F240091 : [Alcool polyvinyle, Dioxyde de titane (E171), Macrogol /PEG, Talc, Oxyde de fer rouge (E172).

Excipients à effet notoire : Lactose monohydraté.

Indication thérapeutique :

RUVAST® 10 mg / 20 mg, comprimés pelliculés biconvexes, de couleur rose, ronds, gravés (RS 10 ; RS 20) sur une face et non gravés sur l'autre face, présentés dans une boîte de 30 comprimés, appartiennent à un groupe de médicaments appelés «statines».

RUVAST® vous a été prescrit parce que :

Vous avez un taux élevé de cholestérol ce qui signifie que vous présentez un risque de faire une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. RUVAST® est utilisé chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés de 6 ans et plus pour traiter un taux de cholestérol élevé.

Il vous est recommandé de prendre des statines, car parfois un régime alimentaire adapté et une activité physique ne suffisent pas à corriger votre taux de cholestérol. Vous devez poursuivre le régime hypocholestérolémiant et l'activité physique en même temps que la prise de RUVAST®.

Où

Vous avez d'autres facteurs qui augmentent votre risque d'avoir une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé liés à ces facteurs.

Une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé liés à ces facteurs peuvent être causés par une maladie appelée l'athérosclérose.

L'athérosclérose est due à une accumulation de dépôts de graisse dans vos artères.

Vous devez continuer à prendre RUVAST®, même si votre taux de cholestérol revient à la normale, parce qu'il prévient la remontée de votre taux de cholestérol et donc l'accumulation de dépôts de graisse. Cependant, vous devez arrêter votre traitement si votre médecin vous le dit, ou si vous découvrez que vous êtes enceinte.

Posologie :

Il faut toujours prendre ce médicament comme votre médecin vous l'a prescrit. Vérifiez auprès de votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute.

Dois-usesuelles chez les adultes

Si vous prenez RUVAST® pour un taux de cholestérol élevé :

Dose initiale

Votre traitement avec RUVAST® doit débiter avec une dose de 5 ou 10 mg, même si vous prenez une dose plus élevée d'un autre statine avant. Le choix de la dose initiale dépendra de :

- Votre taux de cholestérol.
- Votre niveau de risque d'avoir une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.
- Facteurs pouvant vous rendre plus sensible à certains effets indésirables. Veuillez vérifier auprès de votre médecin ou votre pharmacien la dose initiale qui vous est le mieux adaptée.
- Votre médecin peut décider de vous donner la dose la plus faible (5 mg) si :
 - Vous êtes d'**origine asiatique** (japonais, chinois, philippin, vietnamien, coréen ou indien).
 - Vous êtes Agés de **plus de 70 ans**.
 - Vous présentez des problèmes rénaux modérés.
 - Vous présentez des facteurs de risque de douleurs musculaires (myopathie).

Augmentation de la dose et dose maximale quotidienne :

Votre médecin peut décider d'augmenter les doses jusqu'à ce que la posologie de RUVAST® soit appropriée pour vous. Une période de 4 semaines est nécessaire entre chaque adaptation de dose.

La dose maximale quotidienne de RUVAST® est de 40 mg. Cette dose concerne les patients ayant un taux de cholestérol élevé et un risque élevé d'avoir une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral pour lesquels le taux de cholestérol n'a pas été suffisamment baissé avec 20 mg.

Si vous prenez RUVAST® pour réduire le risque d'avoir une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé qui y sont liés :

La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour. Cependant votre médecin pourra décider d'utiliser une dose plus faible si vous avez l'un des facteurs mentionnés ci-dessus.

Contrôle régulier de cholestérol :

Il est important que vous retourniez voir votre médecin pour des contrôles réguliers de cholestérol afin d'être sûr que ce dernier est bien contrôlé.

Votre médecin peut décider d'augmenter la dose de RUVAST® jusqu'à ce qu'elle soit appropriée pour vous.

Utilisation chez les enfants et les adolescents âgés de 6 à 17 ans :

La dose moyenne chez les enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans est de 5 à 20 mg une

fois par jour. La dose initiale usuelle est de 5 mg par jour et votre docteur pourra augmenter progressivement votre dose afin de trouver la dose adaptée de RUVAST®. La dose journalière maximale de RUVAST® est 10 ou 20 mg pour les enfants âgés de 6 à 17 ans en fonction de votre pathologie sous-jacente traitée. Prenez cette dose une fois par jour. La dose de 40 mg de RUVAST® ne doit pas être utilisée chez les enfants.

Mode d'administration :

Voie orale.

Avalez chaque comprimé en entier avec de l'eau.

Prenez RUVAST® une fois par jour. Vous pouvez prendre le comprimé à tout moment de la journée avec ou sans nourriture.

Essayez de prendre votre comprimé chaque jour à la même heure, ceci vous évitera d'oublier de le prendre.

Si vous avez pris plus de RUVAST® comprimé pelliculé, que vous n'auriez dû :

Consultez votre médecin ou l'hôpital le plus proche pour avis.

Si vous allez à l'hôpital ou recevez un traitement pour une autre cause, prévenez l'équipe médicale que vous prenez RUVAST®.

Si vous oubliez de prendre RUVAST® comprimé pelliculé :

Ne vous inquiétez pas, prenez seulement votre prochaine dose au bon moment.

Ne prenez pas de double dose pour compenser celle que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre RUVAST® comprimé pelliculé :

Informez votre médecin si vous souhaitez arrêter de prendre RUVAST®, car votre taux de cholestérol devrait encore augmenter à nouveau si vous arrêtez de prendre RUVAST®.

ADRESSEZ-VOUS À VOTRE MEDECIN OU PHARMACIEN SI VOUS AVEZ D'AUTRES QUESTIONS SUR L'UTILISATION DE CE MEDICAMENT.

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

N'utilisez jamais RUVAST® dans les conditions suivantes :

- Si vous êtes **allergique à la rosuvastatine** ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique excipients).
- Si vous êtes enceinte, ou si vous allaitez, Si vous devenez enceinte pendant que vous prenez RUVAST® arrêtez immédiatement et informez en votre médecin. Il convient de prendre un contraceptif approprié pour éviter de tomber enceinte pendant le traitement par RUVAST®.
- Si vous avez une maladie hépatique.
- Si vous avez des problèmes rénaux graves
- Si vous avez des douleurs musculaires répétées ou inexpliquées.
- Si vous prenez un médicament appelé ciclosporine (utilisée par exemple lors de transplantations d'organes).
- Si vous êtes concernés par l'une de ces situations (ou si vous avez un doute), veuillez consulter votre médecin.
 - Ne prenez pas 40 mg (dosage le plus élevé) :
 - Si vous avez des problèmes rénaux modérés (en cas de doute, veuillez demander à votre médecin).

• Si votre glande thyroïde ne fonctionne pas correctement.

- Si vous avez des douleurs musculaires répétées ou inexpliquées, des antécédents personnels ou familiaux de problèmes musculaires, ou des antécédents de problèmes musculaires lors de la prise d'autres médicaments abaissant le taux de cholestérol.
- Si vous consommez régulièrement des quantités importantes d'alcool.
- Si vous êtes déjà traité par un autre médicament pour abaisser les taux de cholestérol (appelé fibrates).

Enfants et adolescents

- **Si le patient est un enfant âgé de moins de 6 ans :** la rosuvastatine ne doit pas être donnée aux enfants de moins de 6 ans ;
- **Si le patient est âgé de moins de 18 ans :** la dose de 40 mg ne doit pas être utilisée chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans ;
- **EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE RUVAST®.**

Mises en garde et précautions d'emploi :

ADRESSEZ-VOUS À VOTRE MEDECIN OU PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE RUVAST®.

- Si vous avez des problèmes rénaux.
- Si vous avez des problèmes hépatiques.
- Si vous avez des douleurs musculaires répétées ou inexpliquées, des antécédents personnels ou familiaux de problèmes musculaires, ou des antécédents de problèmes musculaires lors de la prise d'autres médicaments abaissant le taux de cholestérol. Prévenez immédiatement votre médecin si vous avez des douleurs musculaires inexpliquées, particulièrement si vous ne vous sentez pas bien ou si vous avez de la fièvre. Informez également votre médecin ou votre pharmacien si vous avez une faiblesse musculaire qui est constante.
- Si vous consommez régulièrement des quantités importantes d'alcool.
- Si vous avez une glande thyroïde ne fonctionne pas correctement.
- Si vous utilisez un autre médicament abaissant les taux de cholestérol appelé fibrates. Veuillez lire attentivement cette notice, même si vous avez déjà pris dans le passé d'autres médicaments qui abaissent le taux de cholestérol.
- Si vous prenez un médicament pour traiter l'infection au VIH, par exemple du ritonavir avec lopinavir, et/ou du zalcitabine, Veuillez-vous reporter à la rubrique « Interactions médicamenteuses ».
- Si vous prenez ou avez pris durant les 7 derniers jours un médicament appelé acide fusidique

(un médicament contre les infections bactériennes), par voie orale ou par injection. L'association d'acide fusidique et de rosuvastatine peut causer de graves problèmes musculaires (rhabdomyolyse). Reportez-vous à la rubrique « Interactions médicamenteuses ».

- Si vous avez plus de 70 ans (votre médecin a besoin de choisir la dose initiale de RUVAST® adaptée pour vous) ;
- Si vous avez une insuffisance respiratoire sévère.

• Si vous êtes d'origine asiatique : japonais, chinois, philippin, vietnamien, coréen ou indien. Votre médecin a besoin de choisir la dose initiale de RUVAST® adaptée pour vous. Si vous êtes concernés par l'une de ces situations (ou si vous avez un doute). Ne prenez pas une dose de 40 mg (le dosage le plus élevé) et vérifiez avec votre médecin si vous prenez un autre médicament avant de débiter toute dose avec RUVAST®.

• Si vous avez des douleurs musculaires inhabituelles qui durent anormalement longtemps, arrêtez de prendre RUVAST® et consultez votre médecin immédiatement.

• Douleur sévère au niveau de l'estomac (inflammation du pancréas).

• Augmentation des enzymes du foie dans le sang.

• Saignement ou apparition d'hématomes plus facilement qu'habituellement dus au faible taux de plaquettes.

• Syndrome lutique (y compris une éruption cutanée, des troubles articulaires et des réactions allergiques graves ; elles peuvent se manifester par un gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge avec difficultés à avaler et respirer, une démangeaison sévère de la peau (avec des cloques). Si vous pensez que vous avez une réaction allergique, vous devez arrêter de prendre RUVAST® et consulter immédiatement un médecin.

• Atteintes des muscles chez l'adulte. Par mesure de précaution, si vous ressentez des douleurs musculaires inhabituelles qui durent anormalement longtemps, arrêtez de prendre RUVAST® et consultez votre médecin immédiatement.

• Douleur sévère au niveau de l'estomac (inflammation du pancréas).

• Augmentation des enzymes du foie dans le sang.

• Saignement ou apparition d'hématomes plus facilement qu'habituellement dus au faible taux de plaquettes.

• Syndrome lutique (y compris une éruption cutanée, des troubles articulaires et des réactions allergiques graves ; elles peuvent se manifester par un gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge avec difficultés à avaler et respirer, une démangeaison sévère de la peau (avec des cloques). Si vous pensez que vous avez une réaction allergique, vous devez arrêter de prendre RUVAST® et consulter immédiatement un médecin.

• Atteintes des muscles chez l'adulte. Par mesure de précaution, si vous ressentez des douleurs musculaires inhabituelles qui durent anormalement longtemps, arrêtez de prendre RUVAST® et consultez votre médecin immédiatement.

• Douleur sévère au niveau de l'estomac (inflammation du pancréas).

• Augmentation des enzymes du foie dans le sang.

• Saignement ou apparition d'hématomes plus facilement qu'habituellement dus au faible taux de plaquettes.

• Syndrome lutique (y compris une éruption cutanée, des troubles articulaires et des réactions allergiques graves ; elles peuvent se manifester par un gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge avec difficultés à avaler et respirer, une démangeaison sévère de la peau (avec des cloques). Si vous pensez que vous avez une réaction allergique, vous devez arrêter de prendre RUVAST® et consulter immédiatement un médecin.

• Atteintes des muscles chez l'adulte. Par mesure de précaution, si vous ressentez des douleurs musculaires inhabituelles qui durent anormalement longtemps, arrêtez de prendre RUVAST® et consultez votre médecin immédiatement.

• Douleur sévère au niveau de l'estomac (inflammation du pancréas).

• Augmentation des enzymes du foie dans le sang.

• Saignement ou apparition d'hématomes plus facilement qu'habituellement dus au faible taux de plaquettes.

• Syndrome lutique (y compris une éruption cutanée, des troubles articulaires et des réactions allergiques graves ; elles peuvent se manifester par un gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge avec difficultés à avaler et respirer, une démangeaison sévère de la peau (avec des cloques). Si vous pensez que vous avez une réaction allergique, vous devez arrêter de prendre RUVAST® et consulter immédiatement un médecin.

• Atteintes des muscles chez l'adulte. Par mesure de précaution, si vous ressentez des douleurs musculaires inhabituelles qui durent anormalement longtemps, arrêtez de prendre RUVAST® et consultez votre médecin immédiatement.

• Douleur sévère au niveau de l'estomac (inflammation du pancréas).

• Augmentation des enzymes du foie dans le sang.

• Saignement ou apparition d'hématomes plus facilement qu'habituellement dus au faible taux de plaquettes.

• Syndrome lutique (y compris une éruption cutanée, des troubles articulaires et des réactions allergiques graves ; elles peuvent se manifester par un gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge avec difficultés à avaler et respirer, une démangeaison sévère de la peau (avec des cloques). Si vous pensez que vous avez une réaction allergique, vous devez arrêter de prendre RUVAST® et consulter immédiatement un médecin.

• Atteintes des muscles chez l'adulte. Par mesure de précaution, si vous ressentez des douleurs musculaires inhabituelles qui durent anormalement longtemps, arrêtez de prendre RUVAST® et consultez votre médecin immédiatement.

Peu fréquents (pouvant affecter 1 cas sur 100 et plus d'1 cas sur 1 000 patients)

- Eruption cutanée, démangeaisons, autres réactions cutanées,
- Augmentation du taux de protéines dans les urines, ceci revient généralement à la normale sans avoir à arrêter le traitement de RUVAST® comprimé pelliculé.

Rares (pouvant affecter 1 cas sur 1000 et plus d'1 cas sur 10 000 patients)

• Réactions allergiques graves ; elles peuvent se manifester par un gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge avec difficultés à avaler et respirer, une démangeaison sévère de la peau (avec des cloques). Si vous pensez que vous avez une réaction allergique, vous devez arrêter de prendre RUVAST® et consulter immédiatement un médecin.

• Atteintes des muscles chez l'adulte. Par mesure de précaution, si vous ressentez des douleurs musculaires inhabituelles qui durent anormalement longtemps, arrêtez de prendre RUVAST® et consultez votre médecin immédiatement.

• Douleur sévère au niveau de l'estomac (inflammation du pancréas).

• Augmentation des enzymes du foie dans le sang.

• Saignement ou apparition d'hématomes plus facilement qu'habituellement dus au faible taux de plaquettes.

• Syndrome lutique (y compris une éruption cutanée, des troubles articulaires et des réactions allergiques graves ; elles peuvent se manifester par un gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge avec difficultés à avaler et respirer, une démangeaison sévère de la peau (avec des cloques). Si vous pensez que vous avez une réaction allergique, vous devez arrêter de prendre RUVAST® et consulter immédiatement un médecin.

• Atteintes des muscles chez l'adulte. Par mesure de précaution, si vous ressentez des douleurs musculaires inhabituelles qui durent anormalement longtemps, arrêtez de prendre RUVAST® et consultez votre médecin immédiatement.

• Douleur sévère au niveau de l'estomac (inflammation du pancréas).

• Augmentation des enzymes du foie dans le sang.

• Saignement ou apparition d'hématomes plus facilement qu'habituellement dus au faible taux de plaquettes.

• Syndrome lutique (y compris une éruption cutanée, des troubles articulaires et des réactions allergiques graves ; elles peuvent se manifester par un gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge avec difficultés à avaler et respirer, une démangeaison sévère de la peau (avec des cloques). Si vous pensez que vous avez une réaction allergique, vous devez arrêter de prendre RUVAST® et consulter immédiatement un médecin.

• Atteintes des muscles chez l'adulte. Par mesure de précaution, si vous ressentez des douleurs musculaires inhabituelles qui durent anormalement longtemps, arrêtez de prendre RUVAST® et consultez votre médecin immédiatement.

• Douleur sévère au niveau de l'estomac (inflammation du pancréas).

• Augmentation des enzymes du foie dans le sang.

• Saignement ou apparition d'hématomes plus facilement qu'habituellement dus au faible taux de plaquettes.

• Syndrome lutique (y compris une éruption cutanée, des troubles articulaires et des réactions allergiques graves ; elles peuvent se manifester par un gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge avec difficultés à avaler et respirer, une démangeaison sévère de la peau (avec des cloques). Si vous pensez que vous avez une réaction allergique, vous devez arrêter de prendre RUVAST® et consulter immédiatement un médecin.

• Atteintes des muscles chez l'adulte. Par mesure de précaution, si vous ressentez des douleurs musculaires inhabituelles qui durent anormalement longtemps, arrêtez de prendre RUVAST® et consultez votre médecin immédiatement.

• Douleur sévère au niveau de l'estomac (inflammation du pancréas).

• Augmentation des enzymes du foie dans le sang.

• Saignement ou apparition d'hématomes plus facilement qu'habituellement dus au faible taux de plaquettes.

• Syndrome lutique (y compris une éruption cutanée, des troubles articulaires et des réactions allergiques graves ; elles peuvent se manifester par un gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge avec difficultés à avaler et respirer, une démangeaison sévère de la peau (avec des cloques). Si vous pensez que vous avez une réaction allergique, vous devez arrêter de prendre RUVAST® et consulter immédiatement un médecin.

• Atteintes des muscles chez l'adulte. Par mesure de précaution, si vous ressentez des douleurs musculaires inhabituelles qui durent anormalement longtemps, arrêtez de prendre RUVAST® et consultez votre médecin immédiatement.

• Douleur sévère au niveau de l'estomac (inflammation du pancréas).

• Augmentation des enzymes du foie dans le sang.

• Saignement ou apparition d'hématomes plus facilement qu'habituellement dus au faible taux de plaquettes.

• Syndrome lutique (y compris une éruption cutanée, des troubles articulaires et des réactions allergiques graves ; elles peuvent se manifester par un gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge avec difficultés à avaler et respirer, une démangeaison sévère de la peau (avec des cloques). Si vous pensez que vous avez une réaction allergique, vous devez arrêter de prendre RUVAST® et consulter immédiatement un médecin.

• Atteintes des muscles chez l'adulte. Par mesure de précaution, si vous ressentez des douleurs musculaires inhabituelles qui durent anormalement longtemps, arrêtez de prendre RUVAST® et consultez votre médecin immédiatement.

• Douleur sévère au niveau de l'estomac (inflammation du pancréas).

• Augmentation des enzymes du foie dans le sang.

• Saignement ou apparition d'hématomes plus facilement qu'habituellement dus au faible taux de plaquettes.

• Syndrome lutique (y compris une éruption cutanée, des troubles articulaires et des réactions allergiques graves ; elles peuvent se manifester par un gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge avec difficultés à avaler et respirer, une démangeaison sévère de la peau (avec des cloques). Si vous pensez que vous avez une réaction allergique, vous devez arrêter de prendre RUVAST® et consulter immédiatement un médecin.

• Atteintes des muscles chez l'adulte. Par mesure de précaution, si vous ressentez des douleurs musculaires inhabituelles qui durent anormalement longtemps, arrêtez de prendre RUVAST® et consultez votre médecin immédiatement.

• Douleur sévère au niveau de l'estomac (inflammation du pancréas).

• Augmentation des enzymes du foie dans le sang.

• Saignement ou apparition d'hématomes plus facilement qu'habituellement dus au faible taux de plaquettes.

• Syndrome lutique (y compris une éruption cutanée, des troubles articulaires et des réactions allergiques graves ; elles peuvent se manifester par un gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge avec difficultés à avaler et respirer, une démangeaison sévère de la peau (avec des cloques). Si vous pensez que vous avez une réaction allergique, vous devez arrêter de prendre RUVAST® et consulter immédiatement un médecin.

• Atteintes des muscles chez l'adulte. Par mesure de précaution, si vous ressentez des douleurs musculaires inhabituelles qui durent anormalement longtemps, arrêtez de prendre RUVAST® et consultez votre médecin immédiatement.

• Douleur sévère au niveau de l'estomac (inflammation du pancréas).

• Augmentation des enzymes du foie dans le sang.

• Saignement ou apparition d'hématomes plus facilement qu'habituellement dus au faible taux de plaquettes.

• Syndrome lutique (y compris une éruption cutanée, des troubles articulaires et des réactions allergiques graves ; elles peuvent se manifester par un gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge avec difficultés à avaler et respirer, une démangeaison sévère de la peau (avec des cloques). Si vous pensez que vous avez une réaction allergique, vous devez arrêter de prendre RUVAST® et consulter immédiatement un médecin.

• Atteintes des muscles chez l'adulte. Par mesure de précaution, si vous ressentez des douleurs musculaires inhabituelles qui durent anormalement longtemps, arrêtez de prendre RUVAST® et consultez votre médecin immédiatement.

• Douleur sévère au niveau de l'estomac (inflammation du pancréas).

• Augmentation des enzymes du foie dans le sang.

• Saignement ou apparition d'hématomes plus facilement qu'habituellement dus au faible taux de plaquettes.

• Syndrome lutique (y compris une éruption cutanée, des troubles articulaires et des réactions allergiques graves ; elles peuvent se manifester par un gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge avec difficultés à avaler et respirer, une démangeaison sévère de la peau (avec des cloques). Si vous pensez que vous avez une réaction allergique, vous devez arrêter de prendre RUVAST® et consulter immédiatement un médecin.

• Atteintes des muscles chez l'adulte. Par mesure de précaution, si vous ressentez des douleurs musculaires inhabituelles qui durent anormalement longtemps, arrêtez de prendre RUVAST® et consultez votre médecin immédiatement.

• Douleur sévère au niveau de l'estomac (inflammation du pancréas).

• Augmentation des enzymes du foie dans le sang.

• Saignement ou apparition d'hématomes plus facilement qu'habituellement dus au faible taux de plaquettes.

• Syndrome lutique (y compris une éruption cutanée, des troubles articulaires et des réactions allergiques graves ; elles peuvent se manifester par un gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge avec difficultés à avaler et respirer, une démangeaison sévère de la peau (avec des cloques). Si vous pensez que vous avez une réaction allergique, vous devez arrêter de prendre RUVAST® et consulter immédiatement un médecin.

• Atteintes des muscles chez l'adulte. Par mesure de précaution, si vous ressentez des douleurs musculaires inhabituelles qui durent anormalement longtemps, arrêtez de prendre RUVAST® et consultez votre médecin immédiatement.

• Douleur sévère au niveau de l'estomac (inflammation du pancréas).

• Augmentation des enzymes du foie dans le sang.

• Saignement ou apparition d'hématomes plus facilement qu'habituellement dus au faible taux de plaquettes.

• Syndrome lutique (y compris une éruption cutanée, des troubles articulaires et des réactions allergiques graves ; elles peuvent se manifester par un gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge avec difficultés à avaler et respirer, une démangeaison sévère de la peau (avec des cloques). Si vous pensez que vous avez une réaction allergique, vous devez arrêter de prendre RUVAST® et consulter immédiatement un médecin.

• Atteintes des muscles chez l'adulte. Par mesure de précaution, si vous ressentez des douleurs musculaires inhabituelles qui durent anormalement longtemps, arrêtez de prendre RUVAST® et consultez votre médecin immédiatement.

• Douleur sévère au niveau de l'estomac (inflammation du pancréas).

• Augmentation des enzymes du foie dans le sang.

• Saignement ou apparition d'hématomes plus facilement qu'habituellement dus au faible taux de plaquettes.

• Syndrome lutique (y compris une éruption cutanée, des troubles articulaires et des réactions allergiques graves ; elles peuvent se manifester par un gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge avec difficultés à avaler et respirer, une démangeaison sévère de la peau (avec des cloques). Si vous pensez que vous avez une réaction allergique, vous devez arrêter de prendre RUVAST® et consulter immédiatement un médecin.

• Atteintes des muscles chez l'adulte. Par mesure de précaution, si vous ressentez des douleurs musculaires inhabituelles qui durent anormalement longtemps, arrêtez de prendre RUVAST® et consultez votre médecin immédiatement.

• Douleur sévère au niveau de l'estomac (inflammation du pancréas).

• Augmentation des enzymes du foie dans le sang.

• Saignement ou apparition d'hématomes plus facilement qu'habituellement dus au faible taux de plaquettes.

• Syndrome lutique (y compris une éruption cutanée, des troubles articulaires et des réactions allergiques graves ; elles peuvent se manifester par un gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge avec difficultés à avaler et respirer, une démangeaison sévère de la peau (avec des cloques). Si vous pensez que vous avez une réaction allergique, vous devez arrêter de prendre RUVAST® et consulter immédiatement un médecin.

• Atteintes des muscles chez l'adulte. Par mesure de précaution, si vous ressentez des douleurs musculaires inhabituelles qui durent anormalement longtemps, arrêtez de prendre RUVAST® et consultez votre médecin immédiatement.

• Douleur sévère au niveau de l'estomac (inflammation du pancréas).

• Augmentation des enzymes du foie dans le sang.

• Saignement ou apparition d'hématomes plus facilement qu'habituellement dus au faible taux de pla

روفاست® 10 مغ

روفاست® 20 مغ

روزوفاستاتين

تركيب مفصل

يحتوي كل قرص مغلف، روفاست® 10 مغ على10.395 مغ من روزوفاستاتين الكالسيوم ما يعادل 10 مغ من روزوفاستين.

كما يحتوي على **قرص مغلف، روفاست® 20 مغ** على 20.790 مغ من روزوفاستاتين الكالسيوم ما يعادل 20 مغ من روزوفاستين.

الوسائط: موهيدرات الأكتون، ميكروكريستالين السيلولوز، فوسفات هيدروجين الكالسيوم المائي، هيدروكسي بنزين، سترات الفسفورين، موكروغول، إيثانول، أوبديراول وجرى®R5F240091. كحول بوليبيثيل، ثنائي أكسيد التيتانيوم (E171)، ماكروغول/ PEG، كالك، أكسيد الحديد الأصفر (E172).

سوغات ذات مفعول معلوم: موهيدرات الأكتون.
ذوات الاستعمال العلاجية: روفاست® 10مغ، 20مغ، قرص مغلفة ثنائية التحجب، وريدية اللون، دائرية، مغشوة (RS 20) IRS 20 على الوجه الأول والوجه الثاني غير مغشوة، في عبوة ثالثة من قرص، تنتمي إلى مجموعة من الأدوية تسمى "الستاتين".

وصف دواء روفاست® 10مغ:

دواء كيميائي من عائلة: هيدروكسي بنزين. ويصنف ذلك أدوية مفعولنا لأخطار أزمات قلبية أو أخرى خفيفة إلى متوسطة. روفاست® 10مغ هو الدواء المراهقين والأطفال بما عمره 6 سنوات وما فوق لعلاج ارتفاع الكوليسترول في الدم.

يمكن لتناول أدوية الستاتين، أن تطعم الكبد والتهاب الكبدى في بعض الأحيان لا سيما، في حال تناول الكوليسترول، يجب أن يتسهموا في علاج تطام غذائي لبعض الكوليسترول والتهاب الكبدى في نفس الوقت الذي تخصمون فيه للعلاج بواسطة روفاست®.

أو

للمقابلة عوامل أخرى تزيد من خطر إصابتكم بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو مشاكل صحية، يجب عدم تناولها.

يمكن أن تحدث نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو مشاكل صحية متعلقة بهذه العوامل بسبب عدم تناول الستاتين الشرايين. سكتة الشرايين يبرح إلى تزكية وضمان الدمون في الشرايين.

كعليك الموصلة في أحد روفاست®، حتى و إن أصبحت نسبة الكوليسترول لديك عالية، لا يبقى من ارتفاع نسبة الكوليسترول لديك من جديد وذلك تراكم الرواسف الحسنة. يجب أن عليك التوقف عن العلاج إذا طلب منك طبيبك إيقافه، حتى لا اكتشاف الحمل.

مقادير الاستخدام: إذا خذ الدواء كما وصفه لكم طبيبك، استشيروا طبيبك أو الصيدلي إذا كنت في حالة شك.

الزجاجات المغلقة عند العلاج **بإرتفاع الكوليسترول في الدم:**

يجب أن يتناولوا علاجكم ب روفاست® بجرعة 5 أو 10 مغ، حتى إذا كنت تتناولون جرعة أعلى من ستاتين آخر من قبل.

بعدم اختيار الجرعة الأولية على:

مستوى الكوليسترول لديك.

مستوى خطر إصابتكم بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، العوامل التي قد تجعلكم أكثر حساسية لبعض الآثار الجانبية.

يريدى مراححة طبيبك أو الصيدلاني لمعرفة الجرعة الأولية المناسبة لكم.

قد يقرر طبيبك إعطائكم أقل جرعة (5 مغ) إذا:

• لستم من أصل اسويي (ياباني، صيني، فيلبيني، فينيانمي، كوري أو هندي).

• ممركم بجدار 70 عامًا.

• كنتم تعاني من مشكلة في الكلى.

• كنتم تأخذون واحد **الأدوية اليموية:**

• زيادة خطر طبيكم لزيادة الجرعات حتى تصبح جرعة روفاست® مناسبة لكم، يترام فترة 4 أسابيع ين كل تعديل للجرعة.

الأد الأقص للجرعة اليموية من روفاست® هو 40 مغ. هذه الجرعة مخصصة للرضع الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول في الدم وارتفاع خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية لم يخضع الكوليسترول فيها بدرجة كافية من جرعة 20 مغ.

إذا كنت تأخذون **روفاست® لتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو مشاكل صحية ذات صلة:**

الجرعة الموصى بها هي 20 مغ مرة واحدة في اليوم. مع ذلك، قد يقرر طبيبك استخدام جرعة أقل إذا كان لديك أي من العوامل المذكورة أعلاه.

المراقبة المتعددة للكوليسترول:

من المهم أن تتعدوا إلى طبيبك لإجراء فحوصات منتظمة للكوليسترول للتأكد من أنك تتقدم فيه جيداً.

قد يقرر طبيكم زيادة جرعة روفاست® حتى تكون مناسبة لكم.

الاستعمال عند الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 11 سنة،

يلعب متوسط الجرعة لدى الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و17 سنة من 5 إلى 20 مغ مرة واحدة يومياً. الجرعة الأولية المعتادة هي 5 مغ يوميًا، ويمكن أن يزيد الطبيب الجرعة تدريجياً للوصول إلى الجرعة المناسبة لكم من روفاست®. الحد الأقصى للجرعة اليموية من روفاست® هو 40 مغ و20 مغ للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 17 عامًا اعتمادًا على المرض الأساسي المعالج. خذوا هذه الجرعة مرة واحدة في اليوم. لا ينبغي أن تستخدم جرعة 40 مغ من روفاست® عند الأطفال.

كيفية الاستعمال:

عن طريق الفم.

تناولوا جرعة واحدة كاملة بالماء.

تناولوا روفاست® مرة واحدة في اليوم. يمكنكم تناول القرص في أي وقت من اليوم مع أو بدون طعام. يجب أن تأخذوا جرعة واحدة في اليوم. يمكنكم تناول القرص في أي وقت من اليوم مع أو بدون طعام.

حاولوا تناول دواءكم مع الوجبة من نفس التوقيت. سيقدم ذلك من نسيان تناولها. **إذا تناولتم علاجكم أكبر من الموصى به، روفاست®، فربما كنتم:**

استشرىوا طبيبك أو ألقى من مشيتم للحصول على النصائح. إذا كنتم تأخذون روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيبك أو ألقى من مشيتم لتناولها.

إذا **نسيتم تناول روفاست®، فربما كنتم:** قد نسيتم تناول الجرعة التالية في الوقت المناسب. لا تأخذوا جرعة مضاعفة لتعويض تلك التي نسيتم تناولها.

إذا **توقفتم عن تناول روفاست®، فربما كنتم:** أخروا تناولها، إذ كنتم تريدون التوقف عن تناول روفاست® لأن مستوى الكوليسترول في الدم سوف يرتفع مرة أخرى إذا توقفتم عن تناولها.

إذا كنتم تأخذون روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيبك أو ألقى من مشيتم لتناولها.

موانع الاستخدام: إذا كنتم تأخذون روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيبك أو ألقى من مشيتم لتناولها.

إذا كنتم تأخذون روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيبك أو ألقى من مشيتم لتناولها.

إذا كنتم تأخذون روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيبك أو ألقى من مشيتم لتناولها.

إذا كنتم تأخذون روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيبك أو ألقى من مشيتم لتناولها.

إذا كنتم تأخذون روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيبك أو ألقى من مشيتم لتناولها.

إذا كنتم تأخذون روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيبك أو ألقى من مشيتم لتناولها.

إذا كنتم تأخذون روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيبك أو ألقى من مشيتم لتناولها.

إذا كنتم تأخذون روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيبك أو ألقى من مشيتم لتناولها.

إذا كنتم تأخذون روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيبك أو ألقى من مشيتم لتناولها.

إذا كنتم تأخذون روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيبك أو ألقى من مشيتم لتناولها.

إذا كنتم تأخذون روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيبك أو ألقى من مشيتم لتناولها.

إذا كنتم تأخذون روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيبك أو ألقى من مشيتم لتناولها.

إذا كنتم تأخذون روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيبك أو ألقى من مشيتم لتناولها.

إذا كنتم تأخذون روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيبك أو ألقى من مشيتم لتناولها.

إذا كنتم تأخذون روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيبك أو ألقى من مشيتم لتناولها.

إذا كنتم تأخذون روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيبك أو ألقى من مشيتم لتناولها.

إذا كنتم تأخذون روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيبك أو ألقى من مشيتم لتناولها.

إذا كنتم تأخذون روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيبك أو ألقى من مشيتم لتناولها.

إذا كنتم تأخذون روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيبك أو ألقى من مشيتم لتناولها.

إذا كنتم تأخذون روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيبك أو ألقى من مشيتم لتناولها.

إذا كنتم تأخذون روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيبك أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• كنتم تأخذون من العمر أكثر من 70 سنة (تعيين على طبيكم اختبارالجرعة الأولية المناسبة لكم من روفاست®).

• كان لديكم فحوصات تنبسيي جاذ.

• كنتم من أصل اسويي: (ياباني، صيني، فيلبيني، فينيانمي، كوري أو هندي. تعيين على طبيكم اختبارالجرعة الأولية المناسبة لكم من روفاست®).

إذا كنتم مريضين بإحدى الحالات المذكورة أعلاه (أو لديكم شك في ذلك)، لا تناولوا جرعة 40مغ (عائى جرعة) وتكونوا من ذلك مع طبيكم أو الصيدلاني قبل الشروع في أي علاج ب روفاست®.

إذا كنتم مريضين من المرض، يمكن أن يكون ل "ستاتين" تأثيرا على الكبد. يمكن التأكد من ذلك عن طريق إجراء فحص الدم. لهذا السبب، سيجري طبيكم متابعة منتظمة لتأجيل لكم (تعيين كحد) قبل أو خلال العلاج.

أثناء علاجكم بجرعة الدواء، إذا كنتم تعانيون من مرض السكري أو مرضين عرضيين لخطر الإصابة بمرض السكري، سيستم يرتفع مستوى من كلك من قبل طبيكم. يمكنكم الإصابة بمرض السكري إذا كنتم لديكم ارتفاع في نسبة السكر في الدم والحدون. إذا كنتم تعانيون من زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم.

إذا كنتم مريضين بأي من الحالات المذكورة أعلاه أو في حالة شك استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناول روفاست®.

التداخلات الدوائية: إذا كنتم تأخذون روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

إذا كنتم تأخذون روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

إذا كنتم تأخذون روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

زرع الأعضاء، الوارفارين (أو أي دواء مستعمل لتسيير الدم)، الفيربات (مثل جيسورين، فينوبروفين) أو أي دواء آخر مستعمل لتخفيف السيورول (ك إرتاميب، مفادات الحموضة المستعملة لعلاج حموضة المعدة)، إرتروميثين (مضاد حيوي)، حمض الفوسفيك (مضاد حيوي)، دواء مضاد للحموضة (مثل: هيدروكسيد المغنيسيوم)، موانع الحمل (الحبوب)، علاج جوي (مثل: TMS) (لقطاع الضغط، رافورميثين، مستخدم لعلاج السرطان) أو أي من الأدوية اليموية المستخدمة لعلاج العدوى الفيرسية، بما في ذلك عدوى فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد، لوجوجا أو متجمعة من (انترفيروس "تحذيرات واحتياطات الاستخدام")، ريتونايفير، لوبينافير، إنترافير، سيبريفير، أسيكلافير، بارتيرايفير، داسابوفير، فيليانافيفر، جرانزوفير، إيسفير، كيكاريفير، بيسيتنافير، قد يتم تغيير آثار هذه الأدوية مع روفاست® أو قد تؤثر على تأثير روفاست®.

• يجب تجنب تناول بعض الأدوية مع طريق الفم لعلاج عدوى بكتيرية. استشرىوا طبيبك إذا إيقافها هذا مؤقتًا. سيحرككم طبيكم بأكثر الأوقات أمانا لاستئناف روفاست®. قد يؤدي تناول روفاست® مع حمض الفوسفيك، في حال تاحة، إلى ضعف الامتصاص أو إلى تغيير مستوياته في الدم.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.

• يجب تجنب تناول روفاست® مع فيتامين أ، فقد تكونوا قد أخذوا جرعة أعلى مما ينبغي. استشرىوا طبيكم أو ألقى من مشيتم لتناولها.



ش.ذ.م.م **وورلد ميديسن ليميتد**
مركز الجذارة والأعمال القدس، مستوى 05 11-11 Bu CA الشارقة – الجزائر

الصنع والمصين:

ش.ذ.م.م **وورلد ميديسن ليميتد**
المنطقة الصناعية رقم:صم 06؛ واد تيللات – وهران الجزائر.

تاريخ مراححة البشرة: أكتوبر 2019