

فيتايتي®

مكمل غذائي

التقديم

شرب

الوصف: شراب أصفر فاتح إلى برتقالي، بنكهة الفواكه.

المكونات

يحتوي 150 مل من الشراب على:

| | |
|--|----------|
| المكونات النشطة: | |
| مستخلص جاف من نبتة قرع العين..... | 0.600 غ |
| مستخلص جاف من الجنتبانا اليابانية..... | 0.024 غ |
| مستخلص جاف من الهندباء البرية..... | 0.024 غ |
| المنغيز (في شكل هيدرات كبريتات المنغيز)..... | 7.875 مغ |

المواغات: المالتيتول السائل، الغليسول، صوريبت ثيوسايم، نكهة المشمش، ملون أصفر برتقالي ، ماء منقى.

سواء ذات مفعول مطوم:

الغليسول، المالتيتول السائل.

الخصائص الوابئة

فيتايتي® هو تركيبة من منتجات طبيعية من أصل عشبي يحسن الشهية عن طريق تحفيز إفراز المعدة. تتحدد آلية عمله من خلال مكوناته تشمل مستخلصات نبتة قرع العين، الجنتبانا اليابانية، الهندباء البرية ببتانز ، مما يضمن عمل الجهاز الهضمي، ويساهم في الهضم. تحتوي نبتة قرع العين على تركيزات عالية من الكبريت، الموصى به في سوء الهضم. ويسهل الهضم في حالة عسر الهضم. تمتلك نبتة قرع العين خصائص مضادة للتهسين مما تحفز الشهية. تحفز **الجنتبانا اليابانية** الشهية وتحسن الهضم. يحفز **الهندباء البري** الشهية ويحل نوبات عسر الهضم. يمتلك الهندباء البري خصائص مدرة للسفراء ومدرة للبول، ويحتوي على الإينولين الذي يساعد على تحقيق توازن المحيط الجوي المعدي العموي. يساهم **المنغيز** في تنظيم امتصاص الحديد. وهو محفز رئيسي في أيض الجلوكوز والدهون لأنه يضمن تحويل هذه المغذيات إلى طاقة.

دواعي الاستعمال الملاجية:

يستعمل **فيتايتي®** عند الأطفال في الحالات التالية:

- قلة الشهية؛
- اضطرابات هضمية؛
- عسر الهضم.

مقادير الاستعمال:

5. مل لكل 10 كغ من وزن الطفل، مرتين في اليوم. لا ينصح بتجاوز الجرعة المقررة ب 20 مل في اليوم. يحدد الطبيب العلاج ومدته.

كيفية الاستعمال:

عن طريق الفم.
رج. عن الفارورة قبل الاستعمال.
يتم تناول شراب **فيتايتي®** 15 دقيقة قبل وجبات الطعام.
بالإزام الأمر، يمكن تخفيف الشراب في الماء، المصير أو في طعام الطفل.
لتقياس الجرعات، استخدم كوب القياس المرفق.

الإفراط في الجرعة

لم يتم الإبلاغ عن أي حالات جرعة زائدة من **فيتايتي®**. في حالة جرعة زائدة، يوصى بإجراء غسل للمعدة ومعالجة الأعراض.

موانع الاستعمال

- عدم تحمل مكونات الشراب أو فرط الحساسية منها.
- اضطرابات معدية معوية عند الأطفال مثل التهاب المعدة، قرحة المعدة والأمعاء أو القرحة الاثنا عشرية.
- الحمل والرضاعة؛
- الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة.

تحذيرات واحتياطات الاستعمال

- يجب استخدام المنتج الطبي بحذر في حالة وجود حساسية تجاه عائلة الخيميات.
- لا يوصى استخدام هذا الشراب مع المرضى الذين يعانون من عدم تحمل سكر الفواكه (الفاكتوريز) (أمراض وراثية نادرة).
- هذا الشراب يمكن أن يسبب اضطرابات هضمية خفيفة (الإسهال).
- هذا الشراب يمكن أن يسبب الصداع.

تداخل الأدوية

لا يوجد وصف لتداخلات دوائية مع الأدوية الأخرى .

الأثار الجانبية

يستعمل المرضى المنتج الطبي بشكل جيد، يمكن أن تحدث ردود فعل الحساسية والعتيان عندما يستعمل المنتج بجرعات أكبر تلك الموصى بها. قد ينتج عن الاستعمال المفرط تأثير مهمل.

الحمل والرضاعة

يمكن عند الضرورة تناول المنتج أثناء الحمل والرضاعة.

التأثير على القدرة على القيادة وتشغيل آلات أخرى

تم صنع هذا المنتج ليستخدم من طرف الأطفال. لم تتم دراسة التأثير على القدرة على القيادة وتشغيل الآلات.

الشكل والتعبئة

شراب للاستعمال عن طريق الفم في فارورة زجاجية ملونة 150 مل مع غطاء لولبي واقي مزود بحلقة أمان مرفقة بنشرة وكوب قياس مزجج في عبلة من الكرتون.

شروط الحفظ

يحفظ بعيدا عن الضوء في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية. يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال

فترة الحفظ

سنتين من تاريخ الصنع
لا يستعمل بعد انتهاء صلاحية فترة الحفظ

شروط الصفر

يصرف دون وصفة طبية.

المصنع والمبعا



ش ذ م وورلد ميديسين ليميتد

المقر الإداري: 12 تعاونية زهور الطابق الأول ش3 الدار البيضاء وهران-الجزائر

مقر التصنيع: المنطقة الصناعية جز 8 حصة 07-08 و 09 ود تلهبات وهران.



VitAppetit®

Complément Alimentaire

Présentation

Sirop

Description : sirop de couleur jaune clair à orange, goût d'abricot.

Composition

150 ml de sirop contiennent :

Substances Actives :

| | |
|---|----------|
| Extrait sec de Cresson de fontaine | 0.600 g |
| Extrait sec de la Gentiane japonaise | 0.024 g |
| Extrait sec de la Chicorée sauvage | 0.024 g |
| Manganèse (sous forme de sulfate de manganèse)..... | 7.875 mg |

Excipients : maltitol liquide, glycérol, sorbate de potassium, arôme abricot, jaune orangé S, eau purifiée

Excipients à effet notoire :

maltitol liquide, glycérol.

Propriétés pharmacologiques

VITAPPETIT® est une association médicamenteuse d'origine végétale qui améliore l'appétit en stimulant la sécrétion gastrique.

Les extraits de Cresson de fontaine, Gentiane japonaise et de la Chicorée sauvage agissent en synergie en assurant ainsi le fonctionnement du système digestif, et facilitant la digestion.

Le **Cresson de fontaine** contient des concentrations élevées en soufre, recommandé en cas des maux de digestion ; celle-ci améliore la digestion dans les dyspepsies et a des propriétés antihistaminiques qui stimulent l'appétit.

La **Gentiane japonaise** induit l'appétit et améliore la digestion.

La **Chicorée sauvage** stimule l'appétit et résout les épisodes dyspeptiques, elle a des propriétés à la fois cholagogues et diurétiques et contient de l'inuline qui aide à obtenir un équilibre de la flore gastro-intestinale.

Le **Manganèse** contribue au contrôle de l'absorption de fer. Il est le principal catalyseur dans le métabolisme de glucose et des lipides étant donné qu'il favorise la conversion de ces nutriments en énergie.

Indications thérapeutiques

VITAPPETIT® est indiqué chez les enfants dans les cas suivants :

- manque d'appétit ;
- troubles digestifs ;
- dyspepsie.

Posologie

5 ml pour 10 kg du poids de l'enfant ; 2 fois par jour

Il est déconseillé de dépasser la dose de 20 ml par jour.

Le traitement et sa durée sont fixés par le médecin.

Mode d'administration

Voie orale.

Agiter le sirop avant utilisation.

Le sirop VITAPPETIT® est administré 15 minutes avant les repas.

Si nécessaire, le sirop peut être dilué dans l'eau, le jus de fruit ou la nourriture de l'enfant.

Afin de mesurer la dose du sirop, utiliser le gobelet doseur fourni.

Surdosage

Aucun cas de surdosage lié à VITAPPETIT® n'a été rapporté.

Un lavage gastrique et un traitement symptomatique sont recommandés en cas de surdosage.

Contre-indications

- Hypersensibilité à l'un des composants ;
- troubles gastro-intestinaux chez les enfants tels que gastrite, ulcère gastro-duodénal ou duodénal ;
- grossesse et allaitement ;
- enfants âgés de moins de 1 an.

Mise en garde

- Le produit médicamenteux doit être utilisé avec précautions en cas d'allergie aux plantes de la famille des ombellifères.
- L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose (maladie héréditaire rare).
- Ce médicament peut provoquer des troubles digestifs légers (diarrhée).
- Ce médicament peut provoquer des maux de tête.

Interactions médicamenteuses

Aucune interaction médicamenteuse avec d'autres produits médicamenteux n'a été décrite.

Effets indésirables

Le traitement est bien toléré chez les patients. Des réactions de nausée et d'allergie peuvent apparaître lors de l'utilisation des doses supérieures à la dose recommandée. L'administration excessive du produit médicamenteux peut entraîner un effet laxatif.

Grossesse et allaitement

Le traitement est contre-indiqué au cours de la grossesse et l'allaitement.

Conducteurs et utilisateurs de machines

Le produit est conçu pour être administré aux enfants. L'impact sur la capacité de conduire un véhicule ou opérer sur des machines n'a pas été étudié.

Présentation et emballage

Sirop à usage oral conditionné dans des flacons en verre ambré de 150 ml munis d'un bouchon scellé, avec une notice et un gobelet doseur dans une boîte en carton.

Conditions de conservation

Conserver à l'abri de la lumière à une température inférieure à 25°C.

Tenir hors de portée des enfants!

Durée de conservation

2 ans à partir de la date de fabrication.

Ne pas utiliser après la date de péremption.

Conditions de délivrance

Sans prescription médicale.

Fabriquant et conditionneur



WORLD MEDICINE LIMITED

Pharmaceutical Company

SARL World Medicine Limited.

Siège social :

12Coop Immo EL-Zohor 1^{er} étage H3 Cité Dar El Beida, Oran.

Site de fabrication :

Z.I. lot 8 lot 07,08 et 09 Oued Tlelat. Oran.